

ACNOXIN ANDROMACO**Salicílico ácido, resorcina cloranfenicol***Antiacneico antiséptico
astringente bactericida*

- Loción cont. fco. x 140 mL.

FÓRMULA

Cada 100 mL contiene:
 Cloranfenicol 0,5000 g.
 Resorcinol Monoacetato 2,0000 g.
 Acido Salicílico 1,0000 g.
 Excipientes (Docusato de Sodio 0,5000 g; Colorante Azul Patente V 0,0005 g; Hidróxido de Sodio 0,3000 g; Alcohol Etilico 58,0124; Agua Purificada c.s).

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiacneico. Antibacteriano. Antiseborreico. Queratolítico.

INDICACIONES

Acné vulgaris en su forma inflamatoria pápulo-pustulosa y foliculitis de la barba.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA/ PROPIEDADES

Acción Farmacológica: El Acido Salicílico facilita la descamación al solubilizar el cemento intercelular que mantiene unidas las escamas del estrato córneo, aflojando así la queratina. Este efecto queratolítico puede proveer una acción antifúngica porque la remoción del estrato córneo suprime el crecimiento micótico. El Acido Salicílico posee también una leve acción antiséptica.

La eficacia del Resorcinol y sus derivados en el tratamiento de diversas condiciones dermatológicas se relaciona con sus acciones antibacterianas, antifúngicas y queratolíticas. Las dos primeras estarían relacionadas con la precipitación de proteínas. Sin embargo, su acción queratolítica puede contribuir al efecto antifúngico por un mecanismo similar al descrito para el Acido Salicílico.

El Cloranfenicol desarrolla su efecto bacteriostático, a favor de su liposolubilidad, por difusión a través de la membrana celular bacteriana, uniéndose en forma reversible con los ribosomas bacterianos. Previene la transferencia de aminoácidos a las cadenas peptídicas en crecimiento, inhibiendo la formación de uniones peptídicas y la subsecuente síntesis de proteínas.

POSOLOGÍA / DOSIFICACIÓN – MODO DE ADMINISTRACIÓN

Posología habitual: 1 a 3 aplicaciones diarias.

Duración del tratamiento: Según criterio médico.

Vía de Administración: Tópica.
 Dosis máxima y mínima: Máxima 3 aplicaciones diarias. Mínima: 1 aplicación diaria.

Instrucciones de empleo: Lavar previamente la zona afectada y aplicar la loción con un algodón friccionando suavemente.

CONTRAINDICACIONES

No emplear esta medicación cuando existan antecedentes de alergia o reacción tóxica al Cloranfenicol.

Deberá considerarse la relación riesgo/beneficio en caso de sensibilidad al Ácido Salicílico o al Resorcinol.

ADVERTENCIAS

La administración tópica prolongada de Cloranfenicol puede provocar sensibilización de contacto y sobrecrecimiento de gérmenes resistentes.

Se ha informado hipoplasia medular después de la aplicación tópica de Cloranfenicol.

El uso prolongado, especialmente sobre superficies ulceradas puede producir mixedema debido a la acción antitiroidea del Resorcinol.

PRECAUCIONES

Para uso externo exclusivamente.

Evitar el contacto con ojos o mucosas. Si esto ocurriera, enjuagar con abundante agua y si persistiera alguna molestia concurrir a un centro asistencial.

Se aconseja no aplicar sobre la piel irritada o inflamada, lunares o verrugas faciales.

Interacciones: Aquellas preparaciones que contengan alguna de las siguientes sustancias, dependiendo de la cantidad presente, pueden interactuar con esta medicación:

- Jabones o productos para la limpieza de cutis, abrasivos o medicados.

- Preparados para el acné que contengan algunos de los siguientes agentes de descamación o "peeling". Peróxido de Benzoílo. Azufre, Tretinoína.
- Preparados de uso tópico que contengan Alcohol, tales como lociones o cremas de afeitar.

- Cosméticos medicados o más caras con un potente efecto secante. Su uso concurrente puede causar un efecto o deshidratante acumulativo.

REACCIONES ADVERSAS

De incidencia frecuente: Hipersensibilidad al Cloranfenicol (ardor, prurito, enrojecimiento, erupción, hinchazón u otros signos de irritación no presentes antes de la terapia), irritación cutánea leve, picazón, sensación de calos o ardor, enrojecimiento o descamación de la piel.

De incidencia ocasional o rara: Irritación moderada, no presente antes de la terapia.

De incidencia rara: Palidez cutánea, dolor de garganta, fiebre, hemorragias, hematomas, cansancio o debilidad inusuales (discrasias sanguíneas por Cloranfenicol).

SOBREDOSIFICACIÓN:

Ante alguna eventualidad concurrir al Centro Nacional de Toxicología, sito en Teodoro S. Mongelós y Gral. Santos, Asunción. Tel.: 204800, 204908 y 203113.

PRESENTACIÓN

Frascos con 140 mL.