

ACTRON

BAYER

Ibuprofeno*Analgesico, antifebril,
antiinflamatorio*

- 400 mg. x 10 caps. blandas
- 600 mg. x 10 caps. blandas
- 600 mg. x 20 caps. blandas

PRESENTACIÓN :

Cápsulas blandas de gelatina
Analgesico - Antiinflamatorio -
Antifebril

COMPOSICIÓN:

Ibuprofeno 400 mg en un excipiente de PEG 600 240,000 mg, sol. hidróxido de Potasio 34,400 mg, agua purificada 45,600 mg, nipagin 0,791 mg, nipasol 0,198 mg, gelatina 213,576 mg, anhidrisorb 85/70 104,217 mg, amarillo ocaso 0,049 mg.

Ibuprofeno 600 mg en un excipiente de PEG 600 365,40 mg, sol. hidróxido de Potasio 43% 134,10 mg, agua purificada 4,50 mg, nipagin 0,954 mg, nipasol 0,238 mg, gelatina 257,50 mg, anhidrisorb 85/70 125,65 mg, amarillo quinoleina 0,0896 mg, verde FD&C N°3 0,0048 mg.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Analgesico - Antifebril -
Antiinflamatorio.

INDICACIÓN :

ACTRON Rápida Acción está indicado para el alivio sintomático de dolores de espalda, musculares, de cabeza, de dientes, producidos por artritis, dolores menstruales, dolores asociados a estados gripales y para bajar la fiebre.

ACTRON 600 está indicado para estados reumáticos inflamatorios (Artritis reumatoidea), estados reumáticos degenerativos (por ej. Artrosis), estados reumáticos extraarticulares (por ej. Tendinitis), traumatológicos (esguinces, desgarros), odontologías y post intervenciones dentales, cefaleas, migrañas.

MODO DE USO :

Adultos y mayores de 15 años: 1 cápsula cada 6 a 8 horas mientras los síntomas persistan. La dosis diaria no debe superar las 3 cápsulas (1.200 mg/día).

Tomar el medicamento preferentemente después de las comidas

Mayores de 65 años: consulte a su médico

Niños menores de 15 años: consulte a su médico.

CONTRAINDICACIONES:

Alergia al ibuprofeno, aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios. Insuficiencia hepática y re-

nal.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

No use este producto por más de 5 días para el dolor o más de 3 días para la fiebre. Si el dolor o la fiebre continúan o se agravan deberá consultar a su médico. Si se presentan nuevos síntomas, o si el área dolorida está roja o hinchada, consulte a su médico. Si Ud. generalmente consume 3 o más vasos de bebidas alcohólicas por día, consulte a su médico antes de tomar analgésicos.

Aunque el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones que la aspirina y el paracetamol, no deben administrarse juntos excepto bajo supervisión médica.

La ingesta de ibuprofeno puede alterar ciertas pruebas de laboratorio, análisis de sangre fundamentalmente.

Consulte al médico antes de tomar ibuprofeno si sufre de úlcera gástrica o duodenal, enfermedades del hígado o riñón, hipertensión arterial y/o insuficiencia cardíaca.

Reacciones Adversas:

Este medicamento puede producir náuseas, acidez, trombocitopenia (disminución en el número de plaquetas) y reacciones de hipersensibilidad (erupción, prurito, urticaria), dolor estomacal, trastornos en el tránsito intestinal, mareos y cefaleas.