

AILEEN QUIMFA

Acido tióctico

Polineuropatía diabética

- 300 mg x 30 comp rec.
- 600 mg x 30 comp rec.

ACCION TERAPEUTICA:

Antioxidante, Antineurítico.

INDICACIONES TERAPEUTICAS:

Trastornos de la sensibilidad nerviosa debido a polineuropatía diabética.

POSOLOGIA Y MODO DE USO:

La dosis depende del cuadro clínico y criterio del médico.

AILEEN 300: se recomienda administrar 300 mg a 600 mg media hora antes de cualquier ingesta, en una o en 2 tomas, sin masticar y con un poco de líquido,

AILEEN 600: Dosis usual: Ingerir sin masticar, 600 mg/día (1 comprimido recubierto) en una sola toma diaria, realizada lejos de las comidas (preferentemente por la mañana y en ayunas).

Dosis máxima: 1800 mg/día.

No tomar con leche ni otros derivados lácteos, tampoco con suplementos de hierro o antiácidos con sales de magnesio o aluminio (el ácido tióctico inhibe la acción de sustancias que contengan metales).

Duración del tratamiento: debido a que la neuropatía diabética es una enfermedad crónica, podría ser necesario el tratamiento a largo plazo. El médico tratante decidirá la duración del tratamiento para cada paciente en forma individual.

CONTRAINDICACIONES:

Este medicamento está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la formulación.

No deberá ser utilizado en niños y adolescentes dado que no hay suficiente información clínica disponible para su administración en estos grupos etáreos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Las bebidas alcohólicas o los medicamentos que contengan alcohol pueden disminuir el efecto terapéutico del ácido tióctico y por lo tanto no deben ingerirse durante el tratamiento.

Controlar la glucemia antes y durante el tratamiento, pues podría eventualmente ocurrir un descenso de la misma.

Advertencia sobre excipientes:

-Como estos medicamentos contienen lactosa, los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, insuficiencia de lac-

tasa de Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o mala absorción de glucosa o galactosa no deben tomar estos medicamentos.

-Estos medicamentos contienen Almidón parcialmente Pregelatinizado proveniente del Maíz.

REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES:

Puede disminuir la glucemia durante la administración de ácido tióctico como consecuencia del mejoramiento en la utilización de glucosa. Se han descrito síntomas de hipoglucemia incluyendo mareo, diaforesis, cefalea y alteraciones visuales.

En casos muy raros: (<0,01%), síntomas gastrointestinales, por ejemplo, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

De igual forma, se pueden observar reacciones de hipersensibilidad, incluyendo erupciones de la piel, urticaria y prurito. En casos muy raros, después de la administración oral, se ha reportado pérdida temporal del sentido del gusto.

Notificación de sospechas de reacciones adversas:

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema de Farmacovigilancia: farmacovigilancia@quimfa.com.py

RESTRICCIONES DE USO:

Embarazo y Reproducción.

No existe aun suficiente experiencia clínica en mujeres embarazadas. En estos casos deberá evaluarse la relación riesgo-beneficio.

Lactancia

Por no ser conocido aun si el ácido tióctico pasa a la leche materna, no se recomienda su administración durante la lactancia.

Empleo en pediatría.
No se dispone de información sobre la administración de ácido tióctico en los niños.

No se dispone de información fehaciente respecto a la utilización de la forma farmacéutica comprimidos con 600 mg.

CONSERVACION:

Almacenar a temperatura entre 15° y 30 °C.

Estos medicamentos deben ser utilizados únicamente por prescripción médica y no podrán repetirse sin nueva indicación del facultativo. En caso de uso

de estos medicamentos sin prescripción médica, la ocurrencia de efectos adversos e indeseables será de exclusiva responsabilidad de quién lo consume. Si Ud. es deportista y está sometido a control de doping, no consuma estos productos sin consultar a su médico.

Director Técnico: Q. F. Laura Ramírez

Reg. Prof. N° 4.142

Autorizado por D.N.V.S.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS