

ANSIODEX © QUIMFA

Bromhidrato de citalopram

Antidepresivo

- 20 mg. x 30 comp. rec.
- 40 mg. x 30 comp. rec.

FÓRMULA:

ANSIODEX® 20
CITALOPRAM 20 mg

Cada comprimido recubierto contiene:

Citalopram
(Equivalente de citalopram bromhidrato) 20 mg.
Excipientes c.s.p.

ANSIODEX® 40
CITALOPRAM 40 mg

FÓRMULA:

Cada comprimido recubierto contiene:

Citalopram
(Equivalente de citalopram bromhidrato)40 mg.
Excipientesc.s.p.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antidepresivo.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

EpiSodios depresivos mayores.
Trastorno de angustia con o sin agorafobia.

POSOLOGÍA:

Los comprimidos de Citalopram pueden administrarse en una sola toma diaria, en cualquier momento del día, independientemente de las comidas.

Este medicamento está indicado exclusivamente para el adulto y el anciano.

1- Depresión.

Adultos: la dosis mínima eficaz es de 20 mg al día. Dependiendo de la respuesta individual del paciente y de la severidad de la depresión, la dosis puede incrementarse progresivamente hasta un máximo de 60 mg al día. La dosis óptima es de 40 mg/día.

Ancianos: la dosis diaria recomendada es de 20 mg/día. Dependiendo de la respuesta individual del paciente y de la severidad de la depresión, la dosis se puede incrementar hasta un

máximo de 40 mg/día.

Duración del tratamiento: el efecto antidepresivo generalmente se inicia después de 2 a 4 semanas de iniciado el tratamiento. El tratamiento con antidepresivos es sintomático y, por tanto, debe continuarse durante un período de tiempo apropiado, generalmente durante seis meses, a fin de prevenir recaídas. No existen estudios sobre la prevención de recurrencias.

2-Trastorno de angustia.

Adultos: la dosis inicial es de 10 mg al día. Después de una semana se incrementa la dosis a 20 mg/día. La dosis óptima es de 20-30 mg/día. En caso de no obtener respuesta suficiente, esta dosis puede incrementarse hasta un máximo de 60 mg/día.

Ancianos: se recomienda una única dosis oral de 10 mg/día durante la primera semana antes de incrementar la dosis de 20 mg/día. La dosis puede incrementarse hasta un máximo de 40 mg al día dependiendo de la respuesta individual del paciente.

Duración del tratamiento: el tratamiento es de larga duración. Se ha comprobado que se mantiene el efecto terapéutico en tratamientos a largo plazo (1 año).

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al Citalopram.
Insuficiencia renal severa con aclaramiento de creatinina inferior a 20 mL./min. Niños menores de 15 años de edad.

REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES:

Los efectos indeseables observados durante el tratamiento con el Citalopram son generalmente de intensidad leve o moderada. Serán evidentes durante la primera e incluso las dos primeras semanas del tratamiento, y posteriormente desaparecen al mejorar el epiSodio depresivo.

Se han encontrado, en monoterapia o en asociaciones con otros psicótropicos, los siguientes trastornos: Neuropsíquicos: nerviosismo, somnolencia, astenia, cefalea, vértigos, trastor-

nos del sueño, pérdidas de la memoria, tendencia suicida. Gastrointestinales: náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, sequedad de boca. Hepáticos: se han dado casos excepcionales de aumento de las enzimas hepáticas. Cutáneos: exantema, prurito. Visuales: trastornos de la adaptación. Metabólicos: pérdida o aumento de peso. Cardiovasculares: taquicardia, hipotensión ortostática, bradicardia en los pacientes que tienen una frecuencia cardíaca baja previa. De la líbido. De la micción. Diaforesis.