

AURATION^{DALLAS}**COMPOSICIÓN:**

Auration® Suspensión
Carbamazepina 2 g.
Excipientes.....c.s.p.

DESCRIPCIÓN:

Auration® es un antiepiléptico y analgésico específico de las neuralgias de los nervios trigémino y glossofaríngeo.

PROPIEDADES:

Auration® posee una más rápida y eficaz acción que el resto de los antiepilépticos.

Actúa sobre la personalidad del paciente epiléptico y en los tratamientos prolongados no produce los efectos adversos de la difenilhidantoína (ej.: hiperplasia gingival).

INDICACIONES:

Auration® se indica como antiepiléptico para el tratamiento de las crisis parciales con sintomatología completa (crisis psicomotoras, epilepsia del lóbulo temporal), crisis tónico-clónicas generalizadas (gran mal), crisis mixtas.

Como analgésico, Auration® se indica en forma específica en la neuralgia del trigémino y del glossofaríngeo.

POSOLOGÍA:

Adultos: de 4 a 6 comp. de 200 mg o 2 a 3 comp. de 400 mg. En 2 o 3 tomas.

Niños: mayores de 6 años de 2 a 4 comp. de 200 mg. En 2 o 3 tomas.

Menores de 6 años: de 10 a 20 mg/Kg/día de Suspensión al 2 %.

Salvo otra indicación.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

Auration® se administra en forma oral recomendándose iniciar el tratamiento con bajas dosis, las cuales aumentarán gradualmente hasta que se obtenga una respuesta adecuada, luego se disminuye hasta alcanzar el mínimo nivel efectivo.

Se aconseja administrarlo con las comidas y en dosis diarias divididas.

Cuando se añade Auration® a un tratamiento con anticonvulsivantes se lo debe introducir gradualmente mientras que los otros anticonvulsivantes se mantienen o se disminuyen en concordancia.

El tratamiento con Auration® no debe ser interrumpido en forma brusca. Se debe recomendar a los pacientes ser cautos en las tareas que requieren alerta y coordinación (conducir automóviles, operar máquinas, etc.) hasta tanto no se asegure de su reacción particular al tratamiento.

EFFECTOS ADVERSOS:

Somnolencia, sequedad de boca, náusea, diarreas, estreñimiento, ataxia, dificultades en la acomodación, vértigos, cefaleas, confusión y agitación.

PRECAUCIONES:

Se debe advertir al paciente de no tomar alcohol y que consulte si le aparece una erupción cutánea, fiebre o dolor de garganta durante el tratamiento con Auration®.

A las mujeres se les recomienda consultar si comienzan a tomar anticonceptivos orales o quedan embarazadas durante el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a la carbamazepina. Bloqueo atrioventricular.

PRESENTACIONES:

Auration® Suspensión: Frasco conteniendo 100 mL. de suspensión