

ACTIPRAM CHILE-MATHER COMPANY

Citalopram

Antidepresivo

- 30 comp. rec. x 40 mg

PRESENTACIÓN

Envase con 30 Comprimidos

INDICACIONES

Tratamiento de la depresión endógena y exógena.

DOSIS

Para el tratamiento de la depresión se recomienda iniciar la terapia con una dosis de 20 mg a 40 mg una vez al día, pudiendo incrementarse después de 1 a 3 semanas hasta un máximo de 60 mg una vez al día. En pacientes con insuficiencia hepática y en ancianos se recomienda reducir la dosis, sin llegar a superar los 30 mg una vez al día. En pacientes con antecedentes de abuso de alcohol, al igual que en pacientes con neuropatía diabética se recomienda una dosis de 40 mg diarios por vía oral. En crisis de pánico iniciar con 10 mg por 7 días y aumentar la dosis de 20 mg a 30 mg diarios de acuerdo a resultados.

ADVERTENCIAS Y/O PRECAUCIONES

Deberá realizarse un estrecho control en pacientes con tendencias suicidas, especialmente al principio del tratamiento. En caso de insomnio o ansiedad (nerviosismo), se recomienda reducir temporalmente la dosis. Si se produce una crisis maníaca en el paciente, deberá suspenderse el medicamento y establecer el tratamiento adecuado. Se puede administrar solamente después de un lapso de 14 días de suspendido el tratamiento con los IMAO. La toxicidad de este medicamento puede ser potenciada por algunas fenotiazinas (metotrimeprazina, trimeprazina). La asociación con antidepresivos de tipo IMAO-A (moclobemida) puede producir un síndrome serotoninérgico potencialmente grave. La Cimetidina aumenta las concentraciones plasmáticas de Citalopram

DISTRIBUCIÓN

Bajo Receta en Farmacias

CLASE TERAPÉUTICA

Sistema Nervioso Central:
Antidepresivos.

PRINCIPIO ACTIVO

Citalopram 40 mg. X 30 comp.

