

BORTEZOMIB 3,5MG SANDOZ

CASSA BOLLER

Bortezomib

Antineoplásicos

- Caja x 1 vial c/ polv. liof. p/ sol. inyec.

INDICACIONES

Bortezomib Sandoz se utiliza para el tratamiento de mieloma múltiple (un cáncer de la médula ósea) en pacientes mayores de 18 años:

-solo o junto con los medicamentos doxorubicina liposomal pegilada o dexametasona, para los pacientes cuya enfermedad está empeorando (progresiva) después de haber recibido al menos un tratamiento

previo y para los que el trasplante de células madre de sangre no tuvo éxito o no es adecuado.

-en combinación con los medicamentos melfalán y prednisona, para los pacientes cuya enfermedad no ha sido tratada con anterioridad y no son aptos para la quimioterapia de dosis alta con trasplante de células madre de sangre.

-en combinación con los medicamentos dexametasona o dexametasona junto con talidomida, para los pacientes cuya enfermedad no ha sido tratada previamente y antes de recibir altas dosis de quimioterapia con trasplante de células madre de sangre (tratamiento

de inducción).

Bortezomib Sandoz se utiliza para el tratamiento del linfoma de células del manto (un tipo de cáncer que afecta a los ganglios linfáticos) en pacientes de 18 años o más en combinación con los medicamentos rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina y prednisona, para los pacientes cuya enfermedad no ha sido tratada con anterioridad y para los cuales el trasplante de células madre de sangre no es adecuado

