

CINALENT QUIMFA**Cinitapride***Procinético*

- Caja x 20comp.

Cada comprimido contiene:
Cinitaprida (equiv a 1,4 mg de cini-
taprida tartrato).....1mg

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Gastrocinético.

**INDICACIONES
TERAPEUTICAS**

- Tratamiento de la dispepsia tipo
dismotilidad leve-moderada.

- Como tratamiento coadyuvante
del reflujo gastroesofágico en pa-
cientes en los que los inhibidores
de la bomba de protones se hayan
mostrado insuficientes.

**POSOLOGIA Y FORMA DE
ADMINISTRACIÓN:**

Adultos (mayores de 20 años):
1 comprimido, 3 veces al día, 15
minutos antes de cada comida.

No es más eficaz ni conveniente
aumentar la dosis recomendada.

Población pediátrica: No se
aconseja la administración de
Cinitaprida en niños y adolescen-

tes, por no disponer de experien-
cia de su uso en estos grupos de
edades.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al principio acti-
vo o a alguno de los excipientes in-
cluidos en la fórmula del producto.
Cinitaprida no debe administrarse
a pacientes en los que la estimu-
lación de la motilidad gástrica pu-
eda resultar perjudicial, ya sea
por la presencia de hemorragias,
obstrucciones o perforaciones, ni
tampoco a pacientes con probada
disquinesia tardía a neurolépticos.