

**CIPROVAL** SAVAL**Ciprofloxacina clorhidrato monohidrato**

*Antimicrobiano bactericida de amplio espectro*

- 500 mg. Caja x 10 comp. rec.
- 500mg. Caja x 20 comp. rec.

**COMPOSICIÓN**

Cada comprimido contiene:  
Ciprofloxacina 500 mg.

**CIPROVAL D.U.**

Cada comprimido contiene:  
Ciprofloxacina 500 mg (dosis única).

**PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS**

Posee actividad bactericida contra grampositivos y gramnegativos. Posee una alta penetración tisular alcanzando elevadas concentraciones en plasma, orina, riñones, pulmones, huesos, bilis, LCR. Una característica destacada es la ausencia de resistencia mediada por plásmidos.

**INDICACIONES**

Para el tratamiento de infecciones simples o mixtas causadas por dos o más microorganismos sensibles, se destaca infecciones del tracto respiratorio, infecciones urinarias, infecciones gastrointestinales, gonorrea. También es el agente de alternativa en las infecciones producidas por mecanismos resistentes a otros antibióticos.

**POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN**

Pielonefritis: 500 mg cada 12 horas. En infecciones respiratorias, ginecológicas, quirúrgicas y gastrointestinales se recomienda 500 mg cada 12 horas.

**CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

No usar en niños ni en embarazo. No usar durante la lactancia.

Usar con precaución en pacientes con antecedentes conocidos de desórdenes del SNC, convulsiones. Ajustar la dosis en insuficiencia renal.

**REACCIONES ADVERSAS**

En general es bien tolerado. Los efectos más frecuentes son síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, dispepsia, excitación, cansancio, vértigo y dolor de cabeza.

**INTERACCIONES**

Presenta interacciones con antiácidos, teofilina.

**SOBREDOSIFICACIONES**

En caso de sobredosificación, se debe realizar vaciamiento gástrico, si es que el paciente se encuentra conciente. Se debe implementar las medidas necesarias para mantener signos vitales.

**ALMACENAJE**

Almacenar por debajo de 30°C. Protegido de la luz y la humedad.

**CIPROVAL** SAVAL**Ciprofloxacina clorhidrato monohidrato**

*Antimicrobiano bactericida de amplio espectro*

- Sol. oft. fco. got. x 5 mL.
- Unguento oft. pomo x 3,5 gr.

Composición CIPROVAL solución oftálmica:  
Cada 100 mL de solución oftálmica estéril contiene:  
Ciprofloxacina clorhidrato 0,3 g.

CIPROVAL ungüento oftálmico:  
Cada 100 g de ungüento oftálmico estéril contiene:  
Ciprofloxacina clorhidrato 0,3 g.

**PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS**

Ciprofloxacina es un agente antibacteriano sintético de amplio espectro, su acción bactericida es el resultado de la inhibición de la enzima ADN girasa.

Administrado por vía ocular, alcanza concentraciones de 10 mcg/

mL en el film lagrimal.

Presenta alta efectividad contra los microorganismos más comunes presentes en conjuntivitis bacteriana y úlcera corneal (Staphylococcus aureus y epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Serratia, Pseudomonas, Haemophilus, Klebsiella, etc.)

**INDICACIONES**

Como alternativa para el tratamiento de blefaritis y blefarconjuntivitis producida por cepas susceptibles.

**POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN**

Solución oftálmica:  
Según indicación médica.  
Ungüento oftálmico:  
1 cm de ungüento en el saco conjuntival cada 6 horas.

**CONTRAINDICACIONES**

Su uso está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a Ciprofloxacina u otras quinolonas.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

Uso tópico ocular solamente. Con precaución en embarazo y lactancia. No se ha establecido la seguridad y efectividad en niños menores de 12 años.

**REACCIONES ADVERSAS**

Sensación de ardor local, sensación de cuerpo extraño, picazón.

**INTERACCIONES**

No se han descrito.

**SOBREDOSIFICACIONES**

No se ha descrito.

**ALMACENAJE**

Almacenar por debajo de 30°C. Protegido de la luz. No refrigerar.

**PRESENTACIÓN**

Envase sellado de 5 mL de solución oftálmica estéril.  
Pomo con 3,5 g de ungüento oftálmico estéril.