

**CLONAZEPAM © 2,5 MG/ML**

**POLIMED** DISTRIBUIDORA LA

POLICLINICA

**Clonazepam**

*Ansiolítico anticonvulsivo*

- Caja x 1 fco. gotero de 20mL.

**CADA ML DE SOLUCIÓN  
GOTAS ORALES CONTIENE:**

Clonazepam.....2,5 mg

**CONTRAINDICACIONES:**

La mayoría de las formas clínicas de la epilepsia del lactante y del niño, especialmente el pequeño mal típico o atípico, las crisis tónico-clónicas generalizadas, primarias o secundarias.

Clonazepam está igualmente indicado en las epilepsias del adulto y las crisis focales, así como en el "status" epiléptico en todas sus manifestaciones clínicas.

Está contraindicado en los pacientes con antecedentes de alergia al clonazepam o a cualquiera de los excipientes, farmacodependencia, drogodependencia o dependencia alcohólica, en pacientes con miastenia grave y en insuficiencia respiratoria grave.

**POSOLOGÍA Y MODO DE USO:**

Para administración oral.

La posología de Clonazepam debe ser ajustada de forma individualizada para cada paciente según su respuesta clínica, tolerancia al fármaco y edad.

Como norma general, en los casos nuevos, no resistentes al tratamiento, éste se iniciará con dosis bajas de Clonazepam en monoterapia.

Para garantizar un perfecto ajuste de la dosis, se recomienda utilizar la formulación en gotas para los lactantes.

Las gotas se deben mezclar con agua, té o zumos de frutas y se administrarán con una cuchara. Nunca deben administrarse las gotas directamente desde el envase a la boca.

**PAUTAS POSOLÓGICAS ESPECIALES**

Clonazepam puede administrarse simultáneamente con uno o más fármacos antiepilépticos, en cuyo caso habrá que ajustar la dosis de cada fármaco para conseguir el efecto deseado.

El tratamiento con clonazepam, como con cualquier otro anti-

epiléptico, no debe ser suspendido de forma brusca, sino que se irá retirando de forma gradual (ver. Reacciones Adversas).

**PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL:**

No se han realizado estudios sobre la seguridad y eficacia de clonazepam en pacientes con insuficiencia renal, sin embargo de acuerdo con los estudios farmacocinéticos no se precisa ningún ajuste posológico en estos pacientes (ver sección 5.2 Propiedades farmacocinéticas en poblaciones especiales).

**PACIENTES CON ALTERACIONES EN LA FUNCIÓN HEPÁTICA:**

No se han realizado estudios sobre la seguridad y eficacia de clonazepam en pacientes con alteraciones en la función hepática. No existen datos disponibles que indiquen si la insuficiencia hepática influye sobre la farmacocinética de clonazepam (ver. Advertencias y precauciones especiales de empleo).

**ANCIANOS:**

Se debe tener especial cuidado durante el ajuste a dosis elevadas en estos pacientes.

