

CLORIMAX © DALLAS

Clomipramida

Antidepresivo tricíclico

- 25 mg. x 30 comp.

FÓRMULAS

Cada comprimido de Clorimax® 25 contiene:

Clomipramina clorhidrato. 25 mg.
Excipientes c.s.p.

INDICACIONES TERAPEUTICAS

Estados depresivos de diversas etiologías. Depresión asociada con esquizofrenia y trastorno de la personalidad, síndromes depresivos seniles o preseniles, distimias depresivas de naturaleza reactiva, neurótica o psicopática, síndromes obsesivos-compulsivos, fobias y ataques de pánico, estados dolorosos crónicos enuresis nocturna (a partir de los 5 años y previa exclusión de causas orgánicas).

MECANISMO DE ACCIÓN Y DATOS FARMACOCINETICOS

La clomipramina inhibe la recaptación neutral de noradrenalina y serotonina (la inhibición de la recaptación de 5-hidroxitriptamina, es el componente dominante). También tiene propiedades adrenolíticas 1 anticolinérgicas, antihistamínicas y antiserotonérgicas (bloqueo del receptor de 5-HT). Se excreta dos tercios por la orina en forma de conjugados hidrosolubles y cerca de un tercio con las heces. Su vida media es de 12 a 36 horas, y se fija en las proteínas en 96%. Posee un efecto antimuscarínico y sedante moderado.

POSOLÓGIA

La dosis se determinara de manera individual para cada paciente de acuerdo con su cuadro clínico. En una primera etapa se intentarán obtener resultados óptimos con dosis bajas, aumentando en forma cuidadosa sobre todo en jóvenes y pacientes añosos, quienes reaccionan en general más intensamente que los pacientes de edad intermedia. En depresiones, síndrome obsesivo-compulsivo y fobias: vía oral: 1 comprimido de 25 mg, dos o tres veces por día o con un comprimido de 75 mg una vez al día. La dosis diaria se aumentará en forma gradual (por ejemplo, 25 mg al cabo de unos días), 4 a 6 comprimidos de 25 mg o dos comprimidos de 75 mg durante la primera semana de tratamiento. En los casos graves puede indicarse hasta 250 mg diarios. Ante la remisión de la sintomatología se establecerá una dosis de mantenimiento de 2 a 4 comprimidos de 25 mg o 1 comprimido de 75 mg.

Ataque de pánico: 10 mg/día en combinación con una benzodiazepina. Aumentar la dosificación hasta lograr la respuesta deseada y suprimir en forma gradual la benzodiazepina. La dosis puede fluctuar entre 25 mg y 100 mg. Se recomienda no interrumpir el tratamiento durante 6 meses y reducir la dosis con lentitud durante este periodo. La dosis en geriatría son más bajas: comenzar con 10 mg diarios pudiéndose aumentar a 30 mg o 50 mg/día al cabo de 10 días, que se mantendrán hasta el final del tratamiento. En los niños, se comienza la terapéutica con 10 mg/día, al cabo de 10 días se aumenta la dosis diaria a 20 mg, en niños de 5 a 7 años; 20 mg a 50 mg en niños de 8 a 14 años; y a 50 mg o más en los mayores de 14 años. Enuresis nocturna: para niños de 5 a 8 años: de 20 a 30 mg/día; de 9 a 12 años: 1 o 2 comprimidos de 25 mg; mayores de 12 años: 1 a 3 comprimidos de 25 mg

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a los antidepresivos tricíclicos del grupo de las benzodiazepinas. No debe administrarse junto con inhibidores de la monoaminoxidasa como tampoco en el infarto agudo de miocardio. Deberá evaluarse la relación riesgo/beneficio en los siguientes cuadros clínicos; asma, enfermedad maniaco - depresiva, alteraciones cardiovasculares sobre todo en niños o ancianos, difusión hepática o renal, esquizofrenia, crisis convulsiva, retención urinaria.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Deberá administrarse con cautela en pacientes con trastornos cardiovasculares: controlar la tensión arterial, y a los individuos hipotensos o con labilidad circulatoria pueden reaccionar con descenso tensional. Se tendrá precaución en pacientes con hipertiroidismo, con control del cuadro hemático ya que puede existir agranulocitosis. Se controlará la función hepática y renal. Los pacientes con trastornos afectivos bipolares pueden pasar de la depresión a la manía. En esos casos suspender el tratamiento con clomipramina. Ante una sobredosificación con sintomatología grave, taquicardia, arritmias, estupor, ataxia, rigidez muscular, depresión respiratoria, será necesaria la hospitalización del paciente con vigilancia continua del sistema cardiovascular durante 48 horas.

REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES

Reacciones anticolinérgicas: sequedad de la boca, constipación, sudores, trastornos de la micción, trastornos en el SNC, somnolencia, fatiga, aumento del apetito. En ocasiones puede aparecer confusión o alucinaciones, trastornos del sueño. Sistema Cardiovascular: hipertensión ortostática, taquicardia sinusal. Sistema gastrointestinal: náuseas, vómitos, diarrea, anorexia. En ocasiones reacciones alérgicas cutáneas.

INTERACCIONES CON ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS

Los pacientes que necesitan un inhibidor de la monoaminoxidasa, deberán suspender el tratamiento con clomipramina 15 días antes de iniciar la dosis de IMAO. Puede reducir o anular el efecto antihipertensivo de clonidina, guanetidina, betanidina, reserpina y metildopa. Puede reforzar el efecto cardiovascular de los simpaticomiméticos (adrenalina, noradrenalina y anfetamina) dando lugar a arritmias, taquicardia o hipertensión. Administrado en asociación con anticolinérgico, pueden darse estados de hiperexcitación o delirio, como ataques de glaucoma. Tampoco deberá emplearse en combinación con antiarrítmicos del tipo de la quinidina. Si se administra junto con estrógenos, se deberá disminuir la dosis de clomipramina, ya que las hormonas esteroides inhiben el metabolismo de estas sustancias, dando lugar a toxicidad, enmascarándolos efectos terapéuticos y empeorando la depresión. Al disminuir el umbral de las crisis convulsivas, con dosis elevadas disminuye el efecto de la medicación anticonvulsiva por lo que puede requerirse un ajuste de la dosificación para el control de estas crisis, el uso simultáneo con cimetidina inhibe el metabolismo de la clomipramina y aumenta la concentración plasmática dando lugar a toxicidad, por lo que puede ser necesaria una disminución de la dosis del antidepresivos tricíclico.

PRESENTACIONES

Clorimax® 25 estuches conteniendo 30 comprimidos.

CONDICION DE VENTA

Venta bajo receta simple archivada.