

COLMIBE FAPASA

**Atorvastatina cálcica,
Ezetimibe
Colchicina**

Hipocolesterolemia

- 10 mg. x 30 comp.
- 20 mg. x 30 comp.
- 40 mg. x 30 comp.

FÓRMULA:

Cada comprimido de 10 mg contiene:

Atorvastatina cálcica 10,34 mg;
Ezetimibe 10 mg; Excipientes
c.s.p.

Cada comprimido de 20 mg contiene:

Atorvastatina cálcica 20,68 mg;
Ezetimibe 10 mg; Excipientes
c.s.p.

Acción terapéutica:

Hipolipemiente.

INDICACIONES:

Hipercolesterolemia Primaria. Ezetimibe/Atorvastatina está indicado, asociado a la dieta, para disminuir las concentraciones elevadas de colesterol total, colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (C-LDL), apolipoproteína B (APO B), triglicéridos, y para aumentar el colesterol de las lipoproteínas de alta den-

sidad (C-HDL) en los pacientes con hipercolesterolemia primaria, familiar heterocigota y homocigota o con hiperlipidemia mixta.

POSOLOGÍA:

Hipercolesterolemia primaria: Debe indicarse en pacientes bajo tratamiento dietético hipolipemiente y guiar la dosis de acuerdo a los niveles de colesterol total y del C-LDL.

Se debe tomar una sola dosis por la noche con o sin alimentos. La dosificación inicial usual recomendada es de 10/20 mg diarios. Se puede considerar iniciar el tratamiento con 10/10 mg al día en los pacientes que necesitan una disminución menos enérgica del C-LDL.

Se deben medir las concentraciones de los lípidos al cabo de 2 ó más semanas para ajustar la dosificación.

Empleo en pacientes de edad avanzada: No es necesario hacer ningún ajuste de la dosificación en los pacientes de edad avanzada.

Empleo en niños: No se recomienda el tratamiento en niños.

Empleo en pacientes con insu-

ficiencia hepática: No es necesario hacer ningún ajuste de la dosificación en los pacientes con insuficiencia hepática leve (puntuación de Child-Pugh de 5 ó 6). No se recomienda el tratamiento en los pacientes con insuficiencia hepática moderada (puntuación de Child-Pugh de 7 a 9) o severa (puntuación de Child-Pugh mayor de 9).

Empleo en pacientes con deterioro renal: No es necesario hacer ningún ajuste de la dosificación en los pacientes con insuficiencia renal moderada. Si se considera necesario tratar con Ezetimibe-Atorvastatina a pacientes con insuficiencia renal severa (depuración de la creatinina 30 mL/min), las dosificaciones mayores de 10/10 mg/día se deben emplear con precaución.

PRESENTACIONES:

COLMIBE 10: Envases conteniendo 30 comprimidos.

COLMIBE 20: Envases conteniendo 30 comprimidos.

COLMIBE 40: Envases conteniendo 30 comprimidos.