

## **CRONOVAL** ETICOS

### **Acido valproico (ME)**

#### *Anticonvulsivo*

- 250 mg/mL. sol. beb. fco. x 120 mL.
- 500 mg. x 30 comp.

### **MECANISMO DE ACCIÓN**

No se conoce con exactitud el mecanismo de acción del valproato sódico. Los efectos del fármaco pueden estar relacionados, en parte, con incrementos en la concentración cerebral del ácido gammaaminobutírico (GABA), que actúa como neurotransmisor. Estudios en animales han mostrado que el val-

proato sódico inhibe las enzimas succinil-aldehído deshidrogenasa y transferasa, las cuales son importantes para el catabolismo del GABA. También se ha encontrado que el fármaco inhibe la actividad neuronal, al incrementar la conductancia del Potasio.

### **INDICACIONES**

El valproato sódico está indicado para ser usado, solo o asociado, en el tratamiento de las convulsiones de ausencia simples (Petit Mal) y en las crisis de ausencia complejas. También está indicado como te-

rapia adjunta en pacientes con múltiples tipos de convulsiones, incluyendo las crisis de ausencia y en el tratamiento de epilepsias tónico-clónicas.

### **MODO DE USO**

El jarabe debe administrarse por vía oral mezclado con líquidos (agua o jugos) para mejorar el sabor.

### **CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad al fármaco. Insuficiencia hepática. Embarazo. Lactancia.

