

## **DIAREN** SAVAL

### **Atapulgina regular activada, Nifuroxazida**

*Antidiarréico*

- Comp. caja x 20
- Susp. oral fco. x 100 mL.

#### **COMPOSICIÓN**

Cada comprimido contiene:

Nifuroxazida.....200 mg.

Atapulgina activada .....350 mg.

Cada 5 mL de suspensión contiene:

Nifuroxazida .....200 mg.

Atapulgina activada.....500 mg.

#### **PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS**

DIAREN es una asociación de nifuroxazida y atapulgina, destinada al tratamiento etiológico de las diarreas bacterianas.

Esta asociación no se absorbe. Su acción terapéutica está estrictamente circunscrita al lumen gastrointestinal. No tiene actividad sistémica.

#### **INDICACIONES**

Diarreas bacterianas agudas en niños y adultos. Diarreas crónicas.

#### **POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN**

Dosis usuales: adultos y niños mayores de 6 años: un comprimido o una cucharadita de 5 mL de suspensión cuatro veces al día. Niños de 6 meses a 6 años: una cucharadita de 5 mL de suspensión tres veces al día. Niños de 1 a 6 meses: una cucharadita de 5 mL de suspensión dos veces al día.

#### **CONTRAINDICACIONES**

No administrar en niños menores de un mes. Contraindicado en caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes. El uso en el embarazo se debe evaluar de acuerdo a si los posibles beneficios superan los riesgos potenciales. Como en todo tratamiento antidiarreico, debe considerarse la terapia rehidratante.

#### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

Usar con precaución en el embarazo.

Puede producir constipación.

#### **REACCIONES ADVERSAS**

Entre los efectos más comunes, ocasionalmente se ha informado de náuseas y vómitos que se minimizan disminuyendo la dosificación. También se han detectado reacciones de hipersensibilidad.

#### **INTERACCIONES**

En forma aislada se ha reportado reacción tipo disulfiram, al

ser administrado concomitantemente con alcohol.

Atapulgina puede alterar la absorción de algunos fármacos como lincomicina y digoxina.

#### **SOBREDOSIFICACIONES**

La sobredosificación puede presentar intolerancia gástrica como náuseas y vómitos, dolor abdominal y diarreas.

#### **ALMACENAJE**

Almacenar por debajo de los 30°C. Protegido de la luz y la humedad (comprimidos), protegido de la luz. No refrigerar (suspensión).

#### **PRESENTACIÓN**

Comprimidos:

Envase con 20 comprimidos.

Suspensión:

Frasco con 100 mL.