

DUOVAL

SAVAL - DISFAR

Clorfeniramina maleato (ME), Pseudoefedrina clorhidrato (SN)

Antihistamínico descongestivo

- Jarabe x 120 mL.
- Gotas orales caja fco. x 15 mL.

COMPOSICIÓN

Cada mL (24 gotas) de solución gotas contienen:

Clorfenamina maleato 1 mg.
Pseudoefedrina clorhidrato 30 mg.

Cada 5 mL de jarabe contienen:
Clorfenamina maleato 2 mg.
Pseudoefedrina clorhidrato 30 mg.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

DUOVAL es una asociación que incluye pseudoefedrina como descongestionante y clorfenamina como antihistamínico, diseñada para el alivio sintomático de la congestión e inflamación de la mucosa nasal.

INDICACIONES

Congestión de las vías respiratorias altas (incluyendo los senos paranasales y las trompas de Eustaquio), resfrío común, fiebre del heno, rinitis alérgica y vasomotora.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Gotas orales: niños de 2 a 5 años una gota / Kg 3 a 4 veces al día. Se recomienda no exceder los 60 mg/día de Pseudoefedrina. Jarabe: niños de 6 a 12 años, 1 cucharadita, tres a cuatro veces al día.

CONTRAINDICACIONES

Recién nacidos y prematuros, hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Embarazo y lactancia. Hipertensión severa, enfermedad coronaria. Tratamiento con inhibidores de la MAO e hipertiroidismo.

Precauciones y Advertencias
Pacientes hipertensos. Si produce somnolencia, no desempeñar actividades que requieren estados de alerta. Glaucoma de ángulo estrecho, hipertrofia prostática, isquemia cardíaca, hipertiroidismo, diabetes mellitus. Úlcera péptica, alteración pilórico - duodenal.

REACCIONES ADVERSAS

En algunos pacientes produce somnolencia y taquicardia.

INTERACCIONES

La asociación concomitante con depresores del SNC. puede potenciar el efecto sedante de la asociación.

SOBREDOSIFICACIONES

La sobredosificación produce principalmente exacerbación de las reacciones adversas.

ALMACENAJE

Almacenar por debajo de los 30°C. Protegido de la luz (jarabe y gotas).

PRESENTACIÓN

Jarabe:
Frasco con 120 mL
Gotas:
Frasco con 15 mL