

**FAPRIS** FAPASA

## **Desvenlafaxina 50 mg - 100 mg**

*Antidepresivo.*

- 50MG. Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos de liberación controlada.
- 100MG. Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos de liberación controlada.

### **FÓRMULA :**

Cada comprimido recubierto de liberación controlada de 50 mg contiene:

Desvenlafaxina 50 mg

Excipientes c.s.p

Cada comprimido recubierto de liberación controlada de 100 mg contiene:

Desvenlafaxina 100 mg

Excipientes c.s.p

### **ACCIÓN TERAPÉUTICA:**

Antidepresivo.

CÓDIGO ATC: N06AX23

### **INDICACIONES:**

Desvenlafaxina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN), está indicado para el tratamiento del Trastorno Depresivo Mayor (TDM).

El trastorno depresivo mayor (según criterios DSM-IV) implica un estado anímico deprimido o disfórico prominente y relativamente persistente (casi todos los días durante por lo menos 2 semanas) que generalmente interfiere con la función diaria, e incluye por lo menos 5 de los siguientes 9 síntomas: estado anímico deprimido, pérdida de interés en las actividades habituales, cambio significativo en el peso y/o apetito, insomnio o hipersomnio, agitación o retraso psicomotor, aumento de la fatiga, sentimientos de culpa o inutilidad, pensamiento lento o concentración afectada, intentos de suicidio o ideas suicidas.

### **POSOLOGÍA, DOSIFICACIÓN Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:**

Tratamiento inicial del trastorno depresivo mayor:

La dosis recomendada para Desvenlafaxina es de 50 mg una vez por día, con o sin alimentos.

El margen de dosis terapéuticas es de 50 a 200 mg una vez al día. Los incrementos de dosis sólo deben realizarse tras evaluación clínica y no deben superar los 200 mg. Debido al riesgo de reacciones adversas relacionadas con la dosis, debe mantenerse la dosis eficaz más baja. En caso de que esté indicado un incremento de dosis, éste debe llevarse a cabo de manera gradual y a intervalos de al menos 7 días.

Al discontinuar la terapia, se recomienda una reducción de dosis gradual siempre que sea posible para minimizar los síntomas de abstinencia.

Desvenlafaxina debe tomarse aproximadamente a la misma hora cada día. Los comprimidos deben tragarse enteros con líquidos y no se deben dividir, romper, masticar o disolver.

### **PRESENTACIONES:**

Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos de liberación controlada de 50 mg.

Envases conteniendo 30 comprimidos recubiertos de liberación controlada de 100 mg.

