

FUSIQUIM B QUIMFA

Acido Fusídico, Betametasona

*Antibiótico, antiinflamatorio
esteroide.*

- Pomo de 15 g.

FORMULA:

Cada g de crema contiene:

Acido Fusídico..... 20 mg
Betametasona (Equiv. a 1,214 mg Valerato de Betametasona)... 1 mg
Excipientes..... c.s.p.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antibiótico, antiinflamatorio esteroide.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Está indicado para el tratamiento de dermatosis eccematosas, incluyendo eccema atópico, eccema infantil (niños de 1 año o más), eccema discoide, eccema de estasis, eczema de contacto y eczema seborreico cuando la infección bacteriana secundaria es confirmada o sospechosa.

Se debe considerar la orientación oficial sobre el uso apropiado de agentes antibacterianos.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO:

Posología

Un curso de tratamiento único normalmente no debe exceder las 2 semanas.

Modo de Uso

Para uso Tópico dérmico.

Se debe aplicar una pequeña cantidad al área afectada dos veces al día hasta obtener una respuesta satisfactoria. En las lesiones más resistentes, el efecto de Fusiquim B crema puede potenciarse mediante la oclusión con película de polietileno. La oclusión nocturna suele ser adecuada.

CONSERVACIÓN:

Almacenar a temperatura entre 15° y 30°C.

PRESENTACIÓN:

Caja conteniendo pomo de 15 g.

Este medicamento debe ser usado únicamente por prescripción médica y no podrá repetirse sin nueva indicación del facultativo. En caso de uso de este medicamento sin prescripción médica, la ocurrencia de efectos adversos e indeseables será de exclusiva responsabilidad de quien lo consuma.

Si Ud. es deportista y está sometido a control de doping, no consuma estos productos sin consultar a su médico.

Director Técnico: Q. F. Laura Ramírez
Reg. Prof. N° 4.142
Autorizado por D.N.V.S. del M.S.P. y B.S.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS