

HECOTON HEISECKE**Clortalidona***Diurético antihipertensivo*

- 50 mg. x 20 comp.

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido contiene:

Clortalidona50 mg.
Excipientesc.s.**PROPIEDADES****TERAPÉUTICAS:**

El principio activo de HECOTON 50 es la clortalidona, un derivado isoindolínico que produce diuresis prolongada al actuar sobre el mecanismo tubular renal de absorción de electrolitos, produciendo descenso de la tensión arterial.

Su característica principal es la prolongada duración del efecto (vida media: 35-60 horas), que permite largos intervalos en su administración.

Su tolerancia es excelente y su eficacia no disminuye aún en plazos prolongados, lo que lo hace el medicamento ideal para el tratamiento de la hipertensión arterial. Promueve eliminación de Sodio, Potasio, magnesio y agua, con lo cual reduce el volumen circulante. No tiene efectos sobre el músculo liso vascular. Se elimina en forma inalterada por vía renal.

INDICACIONES:

Edemas cardíacos, hepáticos, renales, de causa venosa. Hipertensión arterial. Profilaxis y tratamiento de la gestosis tardía. Como coadyuvante en los tratamientos de la obesidad. Puede asociarse al empleo de inhibidores de la ECA.

CONTRAINDICACIONES:

Debe evaluarse la relación riesgo-beneficio en presencia de anuria y disfunción renal severa, diabetes mellitus, antecedente de gota o hiperuricemia, disfunción hepática, esclerosis cerebral, coronariopatía grave, amamantamiento, hipersensibilidad al componente y a las sulfamidas.

PRECAUCIONES

No posee

POSOLÓGIA:

Salvo mejor criterio médico:

Adultos: 1 comprimido diario con el desayuno; una vez obtenido el resultado deseado un comprimido 3 veces por semana.

Niños: dosis proporcional a la edad y peso.

Cambios de dosis: cada 4 semanas.

PRESENTACIONES:

Caja conteniendo 20 comprimidos.

HECOTON A HEISECKE**Clortalidona amilorida***Diurético ahorrador de Potasio antihipertensivo*

- Caja x 20 comp.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:

Clortalidona 25 mg
Amilorida Hcl10 mg
Excipientesc.s.**PROPIEDADES
TERAPÉUTICAS**

Uno de los dos principios activos de

HECOTÓN A es la clortalidona, un derivado isoindolínico (no es una tiazida en realidad) que produce diuresis prolongada al actuar sobre el mecanismo tubular renal de absorción de electrolitos, produciendo descenso de la tensión arterial. Su característica principal es la prolongada duración del efecto (vida media: 35-60 hs.), que permite largos intervalos en su administración.

Su tolerancia es excelente y su eficacia no disminuye aún en plazos prolongados, lo que lo hace el medicamento ideal para el tratamiento de la hipertensión arterial. Promueve eliminación de Sodio, Potasio, magnesio y agua, con lo cual reduce el volumen circulante). No tiene efectos sobre el músculo liso vascular.

Se elimina en forma inalterada por vía renal. Su dosis es un 50% de la clásica, por encontrarse en HECOTÓN A asociada a la amilorida, diurético que también promueve la excreción de Sodio y agua, pero con retención de Potasio.

INDICACIONES

Cuando se desea un efecto diurético sumado a ahorro de Potasio, en el tratamiento de edemas de diversa etiología y en hipertensión arterial.

Edemas cardíacos, hepáticos, renales, de causa venosa. Hipertensión arterial. Profilaxis y tratamiento de la gestosis tardía. Como coadyuvante en los tratamientos de la obesidad.

Puede asociarse al empleo de inhibidores de la ECA.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los componentes del producto. hiperpotasemia.

Debe evaluarse la relación riesgo - beneficio en presencia de anuria y disfunción renal severa, diabetes mellitus, antecedente de gota o hiperuricemia y disfunción hepática, esclerosis cerebral, coronarios graves, lactancia, hipersensibilidad al componente y a las sulfamidas.

**PRECAUCIONES Y
ADVERTENCIAS**

No ingerir alimentos ricos en Potasio ni fármacos con suplementos de Potasio. Tomar precauciones en ancianos, diabetes, cirrosis hepática y deterioro renal. Las personas de edad avanzada pueden ser más sensibles a los efectos hipotensores y a los cambios electrolíticos del medio interno. Se debe consultar al médico si durante la medicación se presenta sed intensa u otras molestias. Considerar posibles interacciones con otros medicamentos.

REACCIONES ADVERSAS

Mareos, vértigos, ataxia, temblores, depresión, hipotensión, somnolencia, calambres, lasitud.

POSOLÓGIA

Salvo mejor criterio médico, la dosis usual es de: 1 comprimido matinal (en casos excepcionales 2 comprimidos durante el día). Una vez obtenido el resultado deseado: 1 comprimido 3 veces por semana.

PRESENTACIÓN

Caja conteniendo 20 comprimidos. Vía oral