

**HECOVAL** HEISECKE

**Bencilo benzoato benzocaina  
tiabendazol**

*Escabicida*

- Pomada x 25 gr.

**FÓRMULA**

Cada 100 g contiene:

Tiabendazol.....	5 g
Benzocaina.....	2 g
Excipientes .....	c.s.

**PROPIEDADES  
TERAPÉUTICAS**

La escabiosis (sarna) es una afección parasitaria muy contagiosa, que ofrece serias dificultades para su tratamiento. Es producida por un ectoparásito (*Sarcoptes scabiei*) y su propagación se ve favorecida por factores como promiscuidad, humedad del medio y hacinamiento. Las particulares propiedades que posee el tiabendazol, principio activo de HECOVAL, le hacen el medicamento ideal para el tratamiento de la escabiosis. HECOVAL es también útil como coadyuvante en el tratamiento de la oxiuriasis; la aplicación local perianal de HECOVAL destruye las larvas en el interior de los huevos depositados en la zona, eliminando la fuente de auto y heteroinfestación.

En el tratamiento de las dermatomicosis comunes y pediculosis (cuerpo, cabeza, pubis) HECOVAL demuestra ser una opción válida por su eficacia. La acción complementaria del benzoato de bencilo le confiere mayores posibilidades para lograr una más rápida curación. La inclusión de benzocaina (con su acción anestésica) en la pomada y loción elimina el prurito que acompaña siempre a estas patologías.

**INDICACIONES**

Tratamiento de la escabiosis (sarna), de lesiones dérmicas provocadas por larva migrans, de la pediculosis (capitis, corporis, pubis) y de diversas dermatomicosis; útil como complemento en el tratamiento de la oxiuriasis.

**MODO DE USO**

Tratamiento de la escabiosis: por la noche tomar un baño con agua tibia, secarse bien y aplicar la pomada o loción cremosa en las zonas afectadas, friccionando en forma suave. A la mañana siguiente tomar otro baño y repetir la aplicación. Repetir el plan durante 5 días y, de ser necesario, continuar por otro período igual de tiempo. No se aconseja prolongar excesivamente su empleo por la posibilidad de producir dermatitis.

Se aconseja efectuar el tratamiento simultáneo de todos los

sujetos con quien se convive, y, como medida complementaria, hervir la ropa interior y de cama. Tratamiento de la pediculosis: luego de tomar un baño secar bien el pelo y aplicar la pomada o loción cremosa, frotando de manera intensa, hasta la raíz del mismo. Repetir la aplicación por 3 días seguidos en los casos leves y por 8 días en los casos severos.

Para lograr la erradicación total el tratamiento debe efectuarse en todo el grupo familiar que convive con el paciente. En caso de pediculosis corporis desinfectar todas las ropas, propias y de cama.

Tratamiento de la dermatomicosis y larva migrans: friccionar con la pomada o loción cremosa durante 5 minutos, 3 veces por día, hasta que desaparezcan las lesiones.

Tratamiento complementario de la oxiuriasis:

durante la noche y por la mañana, aplicar la pomada en la región anal y perianal, utilizando la cánula que acompaña al envase (la misma luego de su uso debe ser limpiada y esterilizada en agua hirviendo por 10 minutos.). Es imprescindible el tratamiento simultáneo oral de la oxiuriasis.

**REACCIONES ADVERSAS**

Puede producir reacciones cutáneas eritematosas

**ADVERTENCIAS Y  
PRECAUCIONES**

Ante un cambio de coloración en la piel, dolor, edema o neuritis suspender la medicación y consultar con el médico.

**INTERACCIONES**

Son de poca importancia y no se describen

**SOBREDOSIS**

Puede presentarse sensibilidad al producto por una aplicación muy frecuente, que desaparecen al suspender la medicación.

**PRESENTACIONES**

Hecoval pomada:  
caja conteniendo pomo de 25 g