

**HEMOPLEN DALLAS****Levamisol***Inmunostimulante*

- 50mg. Caja x 20 comp.

**FÓRMULA:**

Cada comprimido contiene:

Levamisol  
(Clorhidrato).....50 mg.**PROPIEDADES:**

HEMOPLEN®, contiene Levamisol, que fue usado en forma amplia como antihelmíntico. Numerosos estudios han comprobado que el Levamisol afecta la respuesta inmunológica del paciente y en consecuencia, se lo conoce como un agente "inmunostimulante", que actúa sobre los linfocitos T restaurando las funciones defensivas del huésped, que se encuentran deprimidas.

**INDICACIONES TERAPÉUTICAS:**

HEMOPLEN®, Parasitosis por helmintos. Inmunodepresión por citostáticos. Afecciones que comprometen la respuesta inmunológica, incluyendo infecciones virales, enfermedades reumáticas, y como adyuvante en el tratamiento de neoplasias. Las propiedades inmunostimulantes del Levamisol han sido utilizadas exitosamente en el tratamiento de la estomatitis aftosa. Recientemente, numerosos estudios han demostrado su utilidad en las neoplasias de colon y recto, combinando Levamisol y fluoruracilo en tratamiento adyuvante. Linfomas. Mejoría de la inmunidad posterior a infecciones.

**ACCIÓN FARMACOLÓGICA Y FARMACOCINÉTICA:**

Es un fármaco con acción antiparasitaria. Estimula también la respuesta inmunitaria, normaliza la función de los linfocitos, macrófagos y polimorfonucleares. Es rápidamente absorbido vía oral, con un pico plasmático a las 1,5 a 2 hs. posee una vida media de 3 a 4 horas. Es metabolizado en el hígado y excretado en un 95% por el riñón y 5 % por las heces.

**CONTRAINDICACIONES:**

El uso de HEMOPLEN® debe ser evitado en pacientes con enfermedades renales o hepáticas avanzadas, y en aquellos con trastornos hematológicos.

**REACCIONES ADVERSAS Y EFECTOS COLATERALES:**

HEMOPLEN en general es bien tolerado, no obstante puede producir náuseas, vómitos. El uso prolongado puede ocasionar reacciones de hipersensibilidad tales como fiebre, artralgia, do-

lores musculares; efectos sobre el SNC como fatiga, cefalea, insomnio, excitación y convulsiones; trastornos hematológicos como agranulocitosis, leucopenia y trombocitopenia. En pacientes con tratamiento prolongado se recomienda controles hematológicos frecuentes.

**POSOLOGÍA:**

Según criterios médicos; se sugiere como orientación el siguiente esquema.

Como antihelmíntico: ascaris-ancylostoma: adultos y niños 2,5 a 5 mg/kg en 1 sola toma que puede repetirse al 4to día.

Como inmunomodulador:

a) Linfomas:

adultos 150 mg/día durante 3 días seguidos por semana (mínimo 3 semanas).

niños 5 mg/kg durante 3 días seguidos por semana (mínimo 3 semanas).

b) Neoplasias sólidas:

adultos 150 mg/día durante 3 días seguidos por semana (mínimo 3 semanas).

niños 5 mg/kg durante 3 días seguidos por semana (mínimo 3 semanas).

c) Para mejorar inmunidad post-citostáticos:

adultos 150 mg/día el 1er día, los siguientes 2 días sin administrarlos, y al 4to día 150 mg.

niños 2,5 mg/kg el 1er día, los siguientes 2 días sin administrarlos, y al 4to día 2,5 mg/kg.

d) Artritis reumatoidea:

adultos 150 mg/día durante 2 días seguidos.

niños 2,5 mg/kg durante 2 días seguidos.

**PRESENTACIÓN:**

Caja conteniendo 10 comprimidos.

Caja conteniendo 20 comprimidos.

