

IDENA FAPASA

Ibandronato sódico monohidrato

Tratamiento osteoporosis

- 150 mg. x 1 comp. rec.

FÓRMULA:

Cada comprimido recubierto contiene:

Ibandronato Sódico Monohidrato 168,75 mg (Eq. a Ibandronato Acido Libre 150 mg)

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Inhibidor de la reabsorción ósea mediada por los osteoclastos.

INDICACIONES:

Tratamiento y prevención de la osteoporosis, post menopáusica

POSOLOGÍA, DOSIFICACIÓN Y MODO DE ADMINISTRACIÓN:

La posología para el tratamiento de las osteoporosis post menopáusica es de 1 comprimido de 150 mg tomado siempre el mismo día de cada mes. La dosis para la prevención es de 150 mg 1 vez al mes tomada siempre el mismo día de cada mes.

PRESENTACIÓN:

Envases conteniendo 1 comprimido recubierto.

IDELIB 150 MG. BIOETHIC PHARMA

Idelalisib

Terapia dirigida

- 150mg. 1 fco. x 60 comp. rec.

IDON SAVAL

Domperidona

Antiemético

- 10mg/5mL. Susp. gotas fco. x 15 mL.
- 10mg. Cáps. caja x 30

COMPOSICIÓN

Cada cápsula contiene:
Domperidona 10 mg.

Cada 24 gotas (1 mL) contiene:
Domperidona 10 mg.

Cada 5 mL de suspensión (1 cucharadita) contiene:
Domperidona 5 mg.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Domperidona es un potente inhibidor de la dopamina con efecto antiemético. No tiene acción sobre el SNC ya que atraviesa escasamente la barrera hematoencefálica. Tiene acción estimulante del vaciamiento gástrico.

INDICACIONES

Cápsulas y supositorios adultos: vómitos y náuseas de toda etiología; meteorismo gástrico y colónico, reflujo gastroesofágico; dispepsias producidas por

enlentecimiento de vaciamiento gástrico; pirosis; hipo; vómito del post operatorio; intolerancia gástrica a otros fármacos; coadyuvante en el tratamiento de Parkinson.

Gotas, supositorios pediátricos y suspensión: regurgitación del lactante; vómitos; hipo; reflujo gastroesofágico.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Cápsulas: adultos, 1 cápsula 15 minutos antes del desayuno, almuerzo y comida. Gotas: lactantes y niños menores de 6 años, 1 gota/kg, tres veces al día 15 minutos antes de las comidas.

Suspensión: niños menores de 1 año, ¼ de cucharadita (1,25 mL) tres veces al día, 15 minutos antes de las comidas. Niños de 1 a 3 años, ½ cucharadita (2,5 mL) tres veces al día 15 minutos antes de las comidas. Niños 4 a 7 años, 1 cucharadita llena (5 mL) tres veces al día, 15 minutos antes de las comidas. Niños de 7 a 12 años, 1 ½ cucharadita tres veces al día 15 minutos antes de las comidas. Niños mayores de 12 años, 2 cucharaditas (10 mL) tres veces al día 15 minutos antes de las comidas. Nota: la cucharadita-medida que acompaña el envase indica con un círculo interior la medida de ¼ de cucharadita, y con un círculo exterior, la ½ cucharadita.

Supositorios: la biodisponibilidad de la vía rectal (1/6 de la vía oral) aconseja la siguiente dosificación:

Supositorios pediátricos: niños hasta 2 años: la mitad de un supositorio (cortarlo en sentido longitudinal) una a dos veces al día. Niños entre 2 y 4 años: 1 supositorio cada 12 horas. Niños entre 4 y 6 años: 1 supositorio cada 8 horas. Niños mayores de 6 años: 1 supositorio cada 6 horas.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al principio activo, recién nacidos prematuros.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Administrar con máxima precaución a pacientes que reciban concomitantemente daunorubicina o presenten un compromiso metabólico importante.

Advertencias: administrar a niños menores de 1 año sólo bajo supervisión médica, usar con precaución durante el embarazo.

REACCIONES ADVERSAS

Aisladamente se ha reportado cólica abdominal, cefalea, somnolencia, nerviosismo y prurito.

INTERACCIONES

La administración conjunta de anticolinérgicos puede disminuir la actividad de domperidona.

SOBREDOSIFICACIONES

Con sobredosis se puede presentar cólicos abdominales, cefalea, somnolencia.

ALMACENAJE

Almacenar a no más de 30°C. Protegido de la luz y humedad (cápsulas).

Almacenar a no más de 25°C. Protegido de la luz (supositorios).

Almacenar a no más de 30°C. Protegido de la luz. No refrigerar (gotas y suspensión).

PRESENTACIÓN

Envase con 30 cápsulas.

Frasco con 15 mL gotas.