

IRRIGOR FAPASA**Nimodipino**

*Vasodilatador cerebral
calcioantagonista*

- 30 mg. Caja x 60 comp.

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido contiene: nimodipina 30mg, excipientes cs.

INDICACIONES:

Síntomas de déficit circulatorio cerebral, mareos, acufenos, vértigos, amnesia, irritabilidad de carácter, desorientación, incapacidad de concentración. Insuficiencia cerebrovascular aguda y crónica, déficit neurológico isquémico, secuelas posaccidente vascular encefálico. Precirugía y poscirugía neurovascular, migraña.

DOSIFICACIÓN:

Un comprimido cada 8 a 12 horas. En casos de isquemia aguda o posoperatoria por hemorragia subaracnoidea, es posible la administración de 2 comprimidos cada 6 horas. Los comprimidos deben tomarse independientemente de las comidas.

PRESENTACIÓN:

Env. con 30 y 60 comp.

IRRIGOR FORTE FAPASA**Nimodipino**

*Vasodilatador cerebral
calcioantagonista*

- 60 mg. x 30 comp. rec.

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido contiene: Nimodipina 60mg, excipientes cs.

DOSIFICACIÓN:

En el tratamiento de la insuficiencia cerebral se recomienda 1 comprimido de 60mg, 2 veces por día. Para la profilaxis y el tratamiento del déficit neurológico isquémico, debido a vasospasmo por hemorragia subaracnoidea, puede administrarse una infusión intravenosa durante 5 a 14 días, continuando luego por vía oral con una dosis de 2 comprimidos de 60mg, 2 veces por día. Los comprimidos deben ingerirse sin masticar, con un poco de líquido independientemente de las comidas. En la profilaxis terapéutica del déficit neurológico isquémico por vasospasmos cerebrales tras hemorragias subaracnoideas, el intervalo entre las tomas deberá ser inferior a 8-12 horas.

PRESENTACIÓN:

Env. con 30 comp.

IRRIGOR PLUS FAPASA**Nimodipina citicolina**

*Vasodilatador cerebral
calcioantagonista*

- 30 mg. x 30 comp. comp.

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido contiene: citicolina 100mg, nimodipina 30mg.

INDICACIONES:

Sintomatología secundaria a insuficiencia cerebrovascular: trastornos de memoria, dificultad de concentración e ideación, desorientación temporal o espacial, trastornos de la marcha y el equilibrio, irritabilidad, depresión, mareos, insomnio, acufenos. Secuelas de accidente vasculoencefálico: hemiparesia, hemiplejía, incontinencia de esfínteres. Tratamiento precirugía y poscirugía neurovascular.

DOSIFICACIÓN:

Insuficiencia cerebrovascular crónica: 1 comprimido 3 veces por día. Vasospasmo cerebral: hasta 2 comprimidos cada 4 horas.

PRESENTACIÓN:

Env. con 30 comp.