

LETEX HEISECKE

Meloxicam

Antirreumático Antiinflamatorio

- 15 mg. x 10 comp.
- 15 mg. x 20 comp.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Meloxicam 15 mg.

Excipientes c.s.

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS.

LETEX (meloxicam) es un derivado enolcarboxamídico relacionado con los oxicanos (piroxicam, tenoxicam, sudoxicam) con acción antiinflamatoria, analgésica y antirreumática debida a que desarrolla una potente actividad inhibitoria sobre la ciclooxigenasa-2 (COX-2) en la síntesis de las prostaglandinas. Esta acción de inhibición preferencial COX-2 es su principal ventaja frente a otros AINEs, porque sus efectos ulcerogénicos y renales son menores. Su absorción es prolongada, siendo su vida media de unas 20 horas, lo que permite su administración en una única dosis diaria.

INDICACIONES

LETEX esta indicado en las afecciones que requieran actividad antiinflamatoria y analgésica como artritis reumatoidea, osteoartritis, osteoartrosis, tenosinovitis, bursitis, distensiones miotendinosas, espondilitis anquilosante. Procesos inflamatorios dolorosos agudos y crónicos.

REACCIONES ADVERSAS

Generalmente es bien tolerado siendo sus reacciones adversas poco frecuentes y reversibles. Los estudios con meloxicam no encontraron efectos adversos a nivel cardiovascular distintos de los producidos por los otros AINEs, aunque tiene mayor seguridad al no inducir efectos trombóticos. Los efectos colaterales gastrointestinales que presenta son comunes a todos los AINEs, aunque se describe mayor seguridad gastrointestinal; para minimizar el riesgo potencial de un evento adverso gastrointestinal debe usarse la dosis efectiva más baja durante el menor tiempo posible.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se debe poner atención especial en pacientes con afecciones hepáticas, renales, cardíacas, con hipertensión arterial y en ancianos. No reemplaza a la aspirina para la profilaxis cardiovascular.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a los compo-

nentes del producto. Úlcera gastroduodenal. Insuficiencia hepática o renal severa. No debe ser administrado durante el embarazo y la lactancia, así como tampoco a menores de 15 años.

INTERACCIONES

No utilizar con otros AINE ni anticoagulantes, pues aumenta el riesgo de úlcera péptica y sangrado gastrointestinal. Puede disminuir la acción de las drogas antihipertensivas (betabloqueantes, vasodilatadores y diuréticos).

POSOLOGÍA

Salvo mejor criterio medico:

Dosis de ataque: 1 comprimido de 15 mg al día.

Dosis de mantenimiento : 7,5 a 15 mg al día.

PRESENTACIÓN

Caja con 10 comprimidos de 15 mg.

LETEX PLUS HEISECKE

Meloxicam Pridinol Mesilato

Antiinflamatorio

- 20 comp.

