

MESTIAN KAMPEL**Mesna***Uroprotector*

• 10 amp. iny. x 2 mL.

COMPOSICIÓN.

Mesna (2-mercaptoetansulfonato sódico)

200 mg.

Edetato disódico 0,50 mg.

Hidróxido de Sodio csp pH

7,5 mg.

Agua calidad inyectable csp

2 mL.

INDICACIONES.

MESTIAN ha sido desarrollado para prevenir la cistitis hemorrágica inducida por ifosfamida y otros oxazaforínicos.

DOSIFICACIÓN.

Para la profilaxis de la cistitis hemorrágica producida por ifosfamida, MESTIAN debe ser dado en dosis fraccionadas orales o en bolo endovenoso según convenga. Se administra en una inyección endovenosa en una dosis igual al 20% de la dosis de ifosfamida, conjuntamente con ella. Luego a las 4 y a las 8 horas se repiten las dosis de MESTIAN. La dosis diaria to-

tal de mesna es del 60% de la dosis diaria total de ifosfamida. Para mantener el efecto protector, mesna debe repartirse cada vez que se administre ifosfamida, debiendo ajustarse la dosis de MESTIAN siempre al 60% de la dosis diaria total de ifosfamida, en tres tomas, tres veces por día, siendo la dosis unitaria del 20% de la dosis total de ifosfamida. Administración

ADMINISTRACIÓN ENDOVENOSA0 horas 4 horas 8 horas
Ifosfamida 1,2 g/m² endov.Mestian 24mg/m² 240mg/m²
240mg/m² endov.

Nota: preparación de la solución endovenosa: MESTIAN se disuelve en: cloruro de Sodio 0,9% estéril, dextrosa al 5% estéril, dextrosa al 5% y cloruro de Sodio 0,9% estéril instantáneamente dando una solución clara sin partículas en suspensión. Concentración final: 20mg mesna/mL. Ejemplo de preparación: a una ampolla de MESTIAN deben adicionarse 8mL de líquido estéril. La solución preparada

es estable por 24 horas a 25°C; no obstante, recomendamos refrigerarlas en caso de que deba retrasarse su aplicación. Junto con la oxazafosforina, inyectar MESTIAN por vía endovenosa en una cantidad equivalente a 20% de la dosis del citostático. Al mismo tiempo tomar MESTIAN por vía oral según el esquema siguiente: pacientes de 25-50kg de peso: 10mL. Pacientes de 50-100kg de peso: 20mL. Pacientes de más de 100kg de peso: 30mL. Repetir estas dosis orales a las 4 y 8 horas posteriores. Se recomienda disolver la dosis indicada en un vaso de bebida carbonatada, juego de frutas, etc. y beber sin demora. Por ej.: pacientes de 70kg de peso: administración oral.

CONTRAINDICACIONES.

Sensibilidad alérgica al principio activo y/o a los compuestos tóxicos.

PRESENTACIÓN

MESTIAN se presenta en los envases de venta de 10 ampollas para la venta al público.