

OFTIC SAVAL - VICOLIH

Diclofenac sódico

Antiinflamatorio ocular

- Sol. oftal. caja fco. x 10 mL.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución oftálmica estéril contiene: Diclofenaco sódico 0,1 g

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Oftic solución oftálmica contiene Diclofenaco sódico, un Antiinflamatorio no esteroideal, que ha demostrado propiedades analgésicas y antiinflamatorias a nivel sistémico y a nivel ocular después de una administración tópica del producto. Estudios clínicos han revelado que Diclofenaco no afecta la presión intraocular, aunque durante la cirugía de cataratas se puede producir una elevación de ésta.

INDICACIONES

Para el tratamiento de la in-

flamación producida en pacientes sometidos a cirugía de catarata.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

1 gota 4 veces al día en el ojo afectado

CONTRAINDICACIONES

No usar en pacientes que usan lentes de contacto blandos o con antecedentes de hipersensibilidad a alguno de los componentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Se recomienda administrar con precaución en pacientes con antecedentes de hemorragia, y que serán intervenidos quirúrgicamente. Debe utilizarse con precaución en embarazo y lactancia y no se ha establecido la seguridad y eficacia en niños.

REACCIONES ADVERSAS

Ardor y escozor pasajeros. En algunos casos se produjo reacción alérgica oculares y en cámara anterior. En algunos casos se ha informado de keratitis. Se reportó una elevación de la presión intraocular.

INTERACCIONES

No se han descrito interacciones de Diclofenaco con otros fármacos, al ser administrado por la vía ocular.

SOBREDOSIFICACIONES

Una sobredosis de solución ocular no produce problemas agudos.

ALMACENAJE

Almacenar a menos de 25°C protegido de la luz.

PRESENTACIÓN

Envase sellado con 10 mL de solución oftálmica estéril.