

OTICUM SAVAL

Polimixina B, neomicina, lidocaina, betametasona

Antiséptico Antiinflamatorio otico

• Gotas x 5 mL.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de solución contiene:

Polimixina B 1.000.000 U.I.

Neomicina 0,35 g.

Betametasona diSodio fosfato 0,1 g.

Lidocaína clorhidrato 2 g.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Oticum es una asociación que contiene antibióticos, corticoide y anestésico, lo que lo hace útil en el tratamiento de las afecciones del oído externo que se caracterizan por presentar un componente infeccioso asociado con inflamación y que, generalmente, cursa con dolor.

INDICACIONES

Tratamiento local de la otitis externa superficial; otitis me-

dia aguda; otitis media crónica; tratamiento local de las mastoiditis; coadyuvante del tratamiento sistémico de las infecciones óticas. Tratamiento sintomático de la inflamación del conducto auditivo externo cualquiera sea su etiología.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Aplicar 3 a 4 gotas dos a cuatro veces al día en el conducto auditivo o en la superficie externa del oído afectado. No calentar la solución sobre 37°C. La aplicación deberá hacerse estando el paciente acostado debiendo permanecer en esta posición durante algunos minutos.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de los principios activos. Herpes simple, vaccinia, varicela e infecciones micóticas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Usese con precaución en pacientes con perforación del tímpano

y en los casos de otitis media crónica prolongada. Usar a temperatura corporal para no alterar la potencia de los antibióticos. El tratamiento prolongado puede producir una multiplicación de microorganismos y hongos.

REACCIONES ADVERSAS

Ocasionalmente pueden presentarse casos de reincidencia de la irritación. La administración de las gotas óticas en algunos casos produce sensación de quemadura y picazón.

INTERACCIONES

No se han descrito.

SOBREDOSIFICACIONES

No se ha descrito.

ALMACENAJE

Almacenar por debajo de los 30°C. Protegido de la luz.

PRESENTACIÓN

Envase con 5 mL de solución estéril.