

SUPRACAM 15 FAPASA**Meloxicam**

Antiinflamatorio analgésico

- Caja x 30 comp.

FÓRMULA:

Cada comprimido de 15 mg contiene: Meloxicam 15 mg; Excipientes c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antiinflamatorio, analgésico

INDICACIONES:

Tratamiento sintomático de artritis reumatoide. Tratamiento sintomático de la osteoartritis dolorosa.

POSOLOGÍA:

Meloxicam puede ser administrado en dosis de 7,5 mg a 15 mg, una vez por día, dependiendo de la severidad de la patología y de las enfermedades concomitantes. Los pacientes deberán recibir la menor dosis que permita lograr una respuesta terapéutica satisfactoria. La

dosis diaria máxima recomendada es de 15 mg/día. La dosis diaria mínima recomendada es de 7,5 mg/día. Los comprimidos deben ingerirse con agua u otros líquidos, con las comidas. En caso de tratamiento combinado con varias formas farmacéuticas de Meloxicam, la dosis diaria total no debe exceder los 15 mg.

PRESENTACIÓN:

Caja conteniendo 30 comprimidos de 15 mg.

SUPRACAM FLEX FAPASA**Meloxicam, mesilato de pridinol**

- Caja x 10 comp.

FÓRMULA:

Cada comprimido contiene: Meloxicam 15 mg; Pridinol Mesilato 4 mg; Excipientes c.s.p.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antiinflamatorio, analgésico y miorrelajante.

INDICACIONES:

Procesos inflamatorios y dolorosos acompañados de contractura muscular. Osteoartritis (artrosis, enfermedades artríticas degenerativas). Patología disco-vertebral: lumbalgia, ciatalgia, neurología cervicobraquial. Reumatismo extra-articular: periartritis escápulo-humeral. Estados inflamatorios y edematosos post-traumáticos.

POSOLOGÍA:

Un comprimido una vez por día. Preferentemente después de las comidas.

PRESENTACIÓN:

Envase conteniendo 10 comprimidos.