

VALAPLEX

CHILE - MATHER COMPANY

Valsartan

Antihipertensivo

- 160 mg. x 30 Comp. rec.
- 80 mg. x 30 comp. rec.
- 320 mg x 30 comp. rec.

PRESENTACIÓN

Envase por 30 comprimidos recubiertos

[otras presentaciones]

INDICACIONES

Hipertensión arterial. Se puede combinar con diuréticos tiazídicos en bajas dosis

DOSIS

Dosis inicial 80 mg una vez al día. Se puede aumentar hasta 320 mg/día en una dosis. La adición de un diurético tiene mayor efecto que incremento de dosis más allá de 80 mg. En ancianos, en pacientes con leve a moderada falla renal o con leve a moderada insuficiencia hepática, no se requiere ajuste inicial de dosis. Puede ser administrado con o sin alimentos y puede ser combinado con otros agentes antihipertensivos.

ACCIONES FARMACÓLOGICAS

Valsartan es un antagonista selectivo y competitivo de los receptores de Angiotensina II del tipo AT1 con lo que elimina los efectos cardiovasculares dañinos de esta molécula. (Aumento de la actividad simpática, Vasoconstricción y Secreción

de Aldosterona). A través de este mecanismo logra bajar la PA hasta los valores normales sin llegar a producir hipotensión. No actúa sobre receptores AT2. Debido a que Valsartan no inhibe la ECA, no afecta la degradación de la Bradikinina. Hidroclorotiazida (HCT): Actúa sobre el mecanismo tubular renal de absorción de electrolitos, aumenta la excreción urinaria de Sodio y agua por inhibición de la reabsorción de Sodio en los Túbulos Contorneados Distales. Aumenta la excreción urinaria de Potasio.

Bajo Receta en Farmacias

CLASE TERAPEÚTICA

Sistema Cardiovascular - Antihipertensivos.

VALAPLEX D

CHILE - MATHER

Valsartan - hidroclorotiazida

Antihipertensivo

- 160/12.5 Mg. Comp. rec. x 30
- 80/12,5 mg. comp. rec. x 30

PRESENTACIÓN

Envase por 30 comprimidos recubiertos

[otras presentaciones]

INDICACIONES

Hipertensión arterial. Se puede combinar con diuréticos tiazídicos en bajas dosis.

DOSIS

Dosis inicial 80 mg una vez al día. Se puede aumentar hasta 320 mg/día en una dosis. La adición de un diurético tiene

mayor efecto que incremento de dosis más allá de 80 mg. En ancianos, en pacientes con leve a moderada falla renal o con leve a moderada insuficiencia hepática, no se requiere ajuste inicial de dosis. Puede ser administrado con o sin alimentos y puede ser combinado con otros agentes antihipertensivos.

ACCIONES FARMACÓLOGICAS

Valsartan es un antagonista selectivo y competitivo de los receptores de Angiotensina II del tipo AT1 con lo que elimina los efectos cardiovasculares dañinos de esta molécula. (Aumento de la actividad simpática, Vasoconstricción y Secreción de Aldosterona). A través de este mecanismo logra bajar la PA hasta los valores normales sin llegar a producir hipotensión. No actúa sobre receptores AT2. Debido a que Valsartan no inhibe la ECA, no afecta la degradación de la Bradikinina. Hidroclorotiazida (HCT): Actúa sobre el mecanismo tubular renal de absorción de electrolitos, aumenta la excreción urinaria de Sodio y agua por inhibición de la reabsorción de Sodio en los Túbulos Contorneados Distales. Aumenta la excreción urinaria de Potasio

Bajo Receta en Farmacias

CLASE TERAPEÚTICA

Sistema Cardiovascular - Antihipertensivo-Diurético.